

III Partie III : Étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien

III.A – Les polynômes d'Hermite.

On note w l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^∞ , définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $w(x) = e^{-x^2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note H_n l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} w^{(n)}(x)$, où $w^{(n)}$ désigne la dérivée n -ième de w .

En particulier : $H_0(x) = 1$.

Q 14. Calculer, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $H_1(x), H_2(x), H_3(x)$.

Q 15. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x).$$

Q 16. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est un polynôme de degré n dont vous déterminerez la parité.

Q 17. Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le coefficient dominant de H_n .

III.B – Un produit scalaire.

On note E l'ensemble des applications f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ continues et telles que $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x)e^{-x^2} dx$ converge.

Q 18. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel contenant $\mathbb{R}[X]$.

Q 19. On note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'application de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui à tout $(f, g) \in E^2$ associe $\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)e^{-x^2} dx$.

Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E .

On notera $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée à ce produit scalaire.

III.C – Lien entre le produit scalaire et les polynômes d'Hermite

Q 20. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $P \in \mathbb{R}[X]$:

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \langle P, H_n \rangle,$$

Q 21. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X] : \langle P, H_n \rangle = 0$.

Q 22. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(H_0, \dots, H_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Q 23. Montrer : $\|H_n\|^2 = \langle H_n^{(n)}, H_0 \rangle$.

Q 24. En déduire la valeur de $\|H_n\|$.

III.D – Étude d'un endomorphisme autoadjoint

On note u, v, w les applications définies de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$, pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, par :

$$u(P) = -P'' + 2XP' + P, \quad v(P) = 2XP - P', \quad w(P) = P'.$$

Q 25. Montrer que u est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ et que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est stable par u .

Par la suite, on notera u_n l'endomorphisme induit par u sur $\mathbb{R}_n[X]$.

On admet que v et w sont aussi des endomorphismes de $\mathbb{R}[X]$, et on note Id l'application identique de $\mathbb{R}[X]$.

Q 26. Établir : $v \circ w = u - \text{Id}$ et $w \circ v = u + \text{Id}$.

Q 27. En déduire : $u \circ v - v \circ u = 2v$.

Q 28. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $P \in \mathbb{R}[X]$, si $u(P) = \lambda P$, alors $u(v(P)) = (\lambda + 2)v(P)$.

Q 29. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, H_k est un vecteur propre de u et déterminer la valeur propre associée.

Q 30. Soit $n \in \mathbb{N}$. Justifier que u_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Q 31. Établir, pour tout $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$:

$$\langle P', Q' \rangle = \langle u(P), Q \rangle - \langle P, Q \rangle.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Q 32. Montrer que u_n est un endomorphisme autoadjoint de $\mathbb{R}_n[X]$.

Q 33. Justifier, d'une deuxième manière, que u_n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ dans une base orthonormée de $\mathbb{R}_n[X]$ formée de vecteurs propres de u_n .

Q 34. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_n[X]$ constituée de vecteurs propres de u_n .

IV Partie IV : Une famille totale

Dans cette partie, nous conservons les notations de la partie III. L'espace E muni de son produit scalaire et la famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ précédemment construite. Nous allons montrer que $(\text{vect}(H_n, n \in \mathbb{N}))^\perp = \{0\}$. On dit dans ce cas là que la famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est totale dans l'espace préhilbertien E ou encore que c'est une base hilbertienne de E .

Q 35. Soit $\xi \in \mathbb{R}$. Pour $\xi \in E$, montrer que $x \mapsto f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

On pourra écrire $f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2} = f(x)e^{-x^2/2}e^{-ix\xi}e^{-x^2/2}$.

On définit ainsi

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-it\xi} e^{-t^2} dt.$$

$\mathcal{F}$ est une application linéaire sur E , appelée la transformation de Fourier de f sur l'espace préhilbertien E . Nous admettons pour la suite que $\mathcal{F}$ est injective sur E .

Q 36. Montrer que, pour tout entier naturel p , la fonction $x \mapsto x^{2p} \exp(-x^2)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

On note $M_p = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2p} \exp(-x^2) dx$. Déterminer la valeur de M_p .

Q 37. Soit $f \in E$. Justifier que

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f(x) e^{-x^2} \frac{(-i)^n \xi^n x^n}{n!} dx$$

Q 38. Montrer que $\mathcal{F}(f)$ est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.

Dans la suite de la partie, on suppose que $f \in (\text{vect}(H_n, n \in \mathbb{N}))^\perp$. Le but est de montrer que f est la fonction nulle.

Q 39. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x) e^{-x^2} dx = 0$.

Q 40. En déduire que $\mathcal{F}(f)$ est la fonction nulle.

Q 41. Conclure.

• • • FIN • • •
